



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações humanas. Todos os dias testemunhamos ou protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida no contexto atual.

Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no lugar do outro para compreender suas posições e atitudes; de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter empatia com o outro.

Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos. Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos.

(...)

Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles podem tê-la mais facilmente do que nós.

Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto, perguntou de imediato: "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?". Ele mudou de ideia.

Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e portadores de deficiência é mais do que contravenção: é falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia. O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais novos é falta de empatia.

A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la para ensiná-la?

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de 2015.

QUESTÃO 01

Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Segundo a autora, a falta de empatia é uma das causas da crise de relações humanas que vivemos hoje;
- () Pelas características inerentes ao texto, pode-se afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação científica;
- () "Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com as diferenças e de respeitá-las;" o pronome destacado está se referindo aos termos crianças e adolescentes;
- () "Pais e professores têm reclamado de comportamentos provocativos, desrespeitosos, desafiadores e desobedientes dos mais novos." Este trecho é um período simples.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 02

Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a opção correta:

- A) "Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à auto-observação, constataríamos essas características também em nós, adultos. A conjunção "entretanto" tem valor semântico de explicação;
- B) "Agredir ostensivamente o outro por suas posições é mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...". O termo destacado é um adjetivo;
- C) No trecho "Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria que eu morresse?" as aspas foram usadas para indicar a fala de alguém no texto;
- D) "Um pai me contou, comovido, que conversava com um amigo a respeito da situação de muitos refugiados de países em guerra e que comentou que não adiantava a busca por outro local, já que a crise de empregos era mundial.". O verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo.



QUESTÃO 03

A tirinha servirá de base para a questão:



Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:

- I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
- II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
- III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
- IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 04

Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:

- A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes;
- B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos Poderes Públicos e da Nação;
- C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
- D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características específicas para cada expediente.

QUESTÃO 05

Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes átonos:

- A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
- B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
- C) O verbo obedecer é transitivo direto;
- D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o pronome, usa-se a mesóclise.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o da Integralidade. Este princípio diz que:

- A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então, cada cidadão, independentemente da etnia, da religião e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os serviços do SUS;
- B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas condições para acessar esse direito; então, o Estado deve prover as condições para que as pessoas sejam tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja tratado conforme sua necessidade;
- C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas as necessidades da população, atuando na prevenção, na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e também sobre os determinantes de saúde;
- D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

QUESTÃO 07

O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve ser democrático e divulgado largamente entre profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é necessário realizar eleições para os cargos titulares e suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários do serviço devem ocupar:

- A) 20% das vagas;
- B) 25 % das vagas;
- C) 50% das vagas;
- D) 65% das vagas

QUESTÃO 08

O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do sistema, fortalecendo a participação popular e informando a população sobre seu funcionamento e forma de gestão. Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
- II. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania e a elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS são algumas das ações deste pacto;
- III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 09

A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde da população;
- () Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- () Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha apenas com as doenças e os agravos já instalados, mas também vigia os fatores de risco e os determinantes/condicionantes do processo saúde-doença, articulando ações preventivas com outros setores;
- () Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a produção e a prestação de serviços.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 10

A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é bastante complexa e envolve uma série de regras que devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação. Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a afirmativa correta:

- A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde serão transferidos para uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
- B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar vinculada às ações inseridas apenas na Programação Anual de Saúde;
- C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar até o final da execução da obra pelo Município;
- D) A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde pode ser realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

RN a termo com 3 horas de vida, assintomático, apresenta na primeira hora de vida uma glicemia de trinta minutos após a primeira mamada menor que 25 mg/dl; amamenta novamente e realiza nova dextro em uma hora ainda menor que 25 mg/dl. Assinale a opção que representa a melhor conduta.

- A) Deve ser feito glicose EV, com velocidade de infusão de glicose (VIG) 4-6 mg/kg/: min;
- B) Deve ser mantido em aleitamento materno e complemento, fazendo controle de sintomas e dextro de 3/3 horas pré-mamada;
- C) Deve ser mantido em aleitamento materno exclusivo;
- D) Deve ser feito glicose EV, com velocidade de infusão de glicose (VIG) 12-14 mg/kg/min.

QUESTÃO 12

Recém-nascido, 41 semanas de idade gestacional, Apgar 9/9, sem fatores de risco, apresenta icterícia em face com 22 horas de vida. História obstétrica sem fatores de risco. Grupo sanguíneo materno: O +, do RN: A +. Exame físico: ativo, mamando bem, já eliminou mecônio e apresentou diurese. É correto afirmar:

- A) Após 36 horas deve ser realizado exames para avaliar exsanguineotransfusão;
- B) Devem ser realizados exames laboratoriais para avaliar incompatibilidade ABO e decidir sobre fototerapia;
- C) Observar e reavaliar a icterícia antes da alta para decidir sobre a realização de exames;
- D) Suspende o aleitamento materno, pois se trata de icterícia associada ao aleitamento materno.

QUESTÃO 13

O quadro clínico de malária no recém-nascido de transmissão transplacentária pode simular:

- A) Síndrome de Allagile;
- B) Sífilis congênita;
- C) Toxoplasmose congênita;
- D) Incompatibilidade sanguínea materno-fetal.

QUESTÃO 14

Uma das indicações de entubação e ventilação com cânula traqueal na sala de parto é:

- A) VPP com máscara não efetiva, mesmo após correção de técnica de aplicação e manutenção de FC < 100 bpm;
- B) VPP prolongada, RN mantém FC > 100 bpm, mesmo assumindo a respiração espontânea;
- C) Gasping após o nascimento;
- D) Atresia de Coanas.

QUESTÃO 15

A Reanimação Neonatal consiste em práticas de cuidado imediato, devendo ser iniciadas dentro do primeiro minuto de vida (Minuto de Ouro) que tem por objetivo favorecer a transição bem sucedida da vida intrauterina. Sobre este assunto analise as afirmativas abaixo:

- I. A Frequência Cardíaca (FC) e o principal determinante das decisões durante as manobras de reanimação neonatal;
- II. A FC é considerada adequada quando > 100 bpm e inadequada se < 100 bpm. A palpação do cordão e a ausculta do precórdio subestimam a FC;
- III. Bebês com FC inadequada e/ou que não iniciaram movimentos respiratórios regulares devem iniciar imediatamente a ventilação com pressão positiva (VPP) e de modo simultâneo o auxiliar instala a oximetria de pulso e a monitorização cardíaca.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 16

Prematuro de 29 semanas de idade gestacional, em tratamento de síndrome do desconforto respiratório, apresenta piora do quadro no quarto dia de vida. Neste momento, mostra-se taquipneico, taquicárdico, com precórdio hiperdinâmico e ictus visível. Apresentando sopro contínuo audível em bordo esternal esquerdo. Este quadro é sugestivo de:

- A) Defeito no septo atrioventricular;
- B) Coarctação da aorta;
- C) Tetralogia de Fallot;
- D) Persistência do canal arterial.

QUESTÃO 17

Ao realizar o exame físico de um recém-nascido percebe-se que a abertura da uretra se encontra anômala, na face dorsal do pênis, que se apresenta encurvada dorsalmente. Os testículos estão tópicos e não existem malformações associadas. O diagnóstico correto é:

- A) Hipospádia;
- B) Epispádia;
- C) Fimose;
- D) Hipospádia proximal.



QUESTÃO 18

Devido ao seu alto grau de acometimento, a enterocolite necrotizante (ECN) tem sido considerada a mais comum emergência clínica / cirúrgica gastrointestinal adquirida no período neonatal, sendo a maior causa de morbidade e mortalidade de recém-nascidos em UTIN de todo mundo. Sobre este assunto é correto afirmar:

- A) A radiografia simples de abdome, geralmente em posição anteroposterior e lateral esquerda, é atualmente o exame de terceira linha para o diagnóstico correto;
- B) Em relação ao tratamento cirúrgico realizado nos pacientes com ECN citam-se como indicação absoluta a presença de pneumoperitônio;
- C) A mortalidade e morbidade possuem relação direta ao peso e idade gestacional de nascimento, sendo raras em recém-nascidos entre 500 e 1500g;
- D) Nos estágios mais iniciais da doença, achados clássicos como distensão abdominal e pneumatose intestinal normalmente não são detectáveis a ultrassonografia.

QUESTÃO 19

O Método Canguru é um modelo de assistência ao recém-nascido prematuro e sua família, internado na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal, voltado para o cuidado humanizado que reúne estratégias de intervenção biopsicossocial. Sobre este assunto é correto afirmar:

- A) A recomendação na terceira etapa é realizar a primeira consulta até 48 horas após a alta. As demais deverão ser agendadas pelas equipes de Saúde e da UBS. Sugerem-se três consultas na primeira semana, duas na segunda semana e uma consulta semanal a partir da terceira semana até que atinja o peso de 2.500 g, quando receberá alta da terceira etapa;
- B) Após o peso de 3000 g, a criança e sua família recebem alta do Método Canguru e seu acompanhamento passa a ser realizado no ambulatório de seguimento do hospital ou referência no município/estado e/ou na UBS;
- C) Envolver os RN pré termos com idade gestacional menor que 34 semanas em saco de polietileno (30 x 50 cm) e colocar touca dupla (plástico e lã/algodão) para evitar perda de calor e hipotermia, já não é mais recomendado ser realizado na sala de parto de acordo com as diretrizes de cuidado do método canguru do MS de 2018;
- D) Posicionar o recém-nascido na redinha, em decúbito dorsal é recomendado para todos do RN.

QUESTÃO 20

Sobre o suporte ventilatório do recém-nascido, analise as afirmativas abaixo:

- I. Sempre que possível o desmame deve começar pelo parâmetro de maior risco (pressão inspiratória), devendo-se reduzir não mais que 2-3 cm-H₂O/vez ou pelo parâmetro que estiver mais distante do valor fisiológico, por exemplo, uma FIO₂ muito elevada;
- II. São indicações da Ventilação Mecânica (VM) a PaO₂ < 70 com FIO₂ alta e PaCO₂ maior que 60 mmHg, principalmente se pH menor que 7.7;
- III. Aumento da pressão em ventrículo direito e aumento da pressão venosa central estão relacionados a alterações hemodinâmicas devido a variações de pressão da ventilação mecânica.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 21

Sobre asfixia perinatal assinale a opção correta:

- A) O uso único do escore de Apgar para diagnóstico de asfixia perinatal para recém-nascido prematuro é seguro já que a acidemia está bem relacionada com o escore de Apgar baixo;
- B) As manifestações clínicas são de natureza exclusivamente respiratória, como a síndrome de aspiração de mecônio;
- C) Dentre os fatores de risco destacam-se o descolamento prematuro de placenta, compressão de cordão umbilical, hipotensão materna e retardo do crescimento intrauterino;
- D) No RN a termo a identificação clínica da asfixia é mais difícil que no RN prematuro, pois alguns achados normais e comuns ao prematuro indicam depressão do SNC no recém-nascido a termo.

QUESTÃO 22

Recém-nascido a termo com diagnóstico de encefalopatia hipóxico-isquêmica moderada, estágio 2, é esperado que se apresente:

- A) Letárgico, com hipotonia leve e com postura flexão distal forte;
- B) Letárgico, com tônus muscular normal e com suave flexão distal, além de estar com movimentos espontâneos super-reativos;
- C) Letárgico, com movimentos espontâneos bem diminuídos, com tônus muscular flácido e com postura de descerebração intermitente;
- D) Com reflexo de Moro e de sucção ausentes, além da ausência dos reflexos tendinosos diminuídos.

**QUESTÃO 23**

RN prematuro, com peso de 1.500g, apresenta dificuldade respiratória desde o momento do nascimento e com piora progressivas nas primeiras 72 horas. Na ausculta pulmonar apresenta MVU diminuído e a radiografia de tórax apresenta infiltrado reticulo-granular difuso. Sobre este diagnóstico, é correto afirmar:

- A) A gasometria arterial revela hipoxemia importante a ar ambiente, com a evolução do quadro há retenção de CO₂ e seguida de alcalose respiratória;
- B) O diagnóstico diferencial deve ser feito com as pneumonias congênitas, em especial estreptococo do grupo B e taquipleurossis transitória;
- C) Esta imagem radiológica é conhecida como imagem de "ar fora";
- D) A utilização de corticosteroide antenatal de forma preventiva não é mais utilizada.

QUESTÃO 24

Sobre as infecções congênitas, é correto afirmar:

- A) O maior risco de transmissão da toxoplasmose acontece no primeiro trimestre e com repercussões mais graves;
- B) No caso de citomegalovírus é comum apresentar além de líquido com pleiocitose, hepatomegalia e petéquias, apresenta também trombocitose;
- C) A pseudoparalisia de Parrot, osteocondrite e periostite estão relacionados a sífilis congênita;
- D) O rastreio de hepatite B, citomegalovirose e hepatite C é feito a partir do segundo trimestre de gestação.

QUESTÃO 25

O manuseio da hipertensão pulmonar persistente do RN (HPPRN) evoluiu muito nas últimas décadas. A respeito deste assunto, analise as afirmativas abaixo:

- I. O foco atual é voltado para estratégias de ventilação gentil para otimizar o recrutamento pulmonar e minimizar barotrauma, volutrauma e efeitos tóxicos do oxigênio;
- II. Deve ser considerado o uso de óxido nítrico inalatório para RN com mais de 34 semanas de idade gestacional e com HPPRN que persiste com hipoxemia;
- III. O uso de surfactante não apresentou melhora da oxigenação, independente da doença parenquimatosa de base.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 26

Para um "teste do pezinho" sem falsos positivos ou falsos negativos deve ter alguns cuidados, como:

- A) Deve ser colhido com 3 a 5 dias de vida, preferencialmente no terceiro dia, e garantir jejum de leite e aminoácidos para evitar um resultado falso-negativo para PKU;
- B) Após 24 horas do nascimento a diminuição das concentrações fisiológicas do TSH pode causar falso-positivo para hipotireoidismo congênito;
- C) O uso de medicações e presença de doenças são fatores restritivos para coleta de amostras;
- D) Em pacientes em UTI neonatal, com alterações hemodinâmicas podem apresentar alteração dos resultados, porém é ideal que esse período para coleta não ultrapasse 30 dias.

QUESTÃO 27

Quanto à indicação do aleitamento materno, é correto afirmar:

- A) RN com leucinose só precisa ter, somente, o nível de valina monitorado para que possa ingerir leite materno;
- B) No caso da fenilcetonúria o aleitamento materno é permitido mesmo sem monitoração dos níveis de fenilalanina;
- C) No caso da galactosemia é completamente contraindicado o aleitamento materno;
- D) A doença de Leigh não representa erro inato do metabolismo.

QUESTÃO 28

RN, sexo feminino, apresentou ecocardiograma com persistência do canal arterial. Com relação a este tema, é correto afirmar:

- A) O quadro clínico da criança a termo assemelha-se ao CIA;
- B) No exame físico pode apresentar sopro típico contínuo, com segunda bulha hiperfonética, podendo apresentar estalidos múltiplos associados;
- C) O exame padrão-ouro é o cateterismo para diagnóstico;
- D) O ECG sempre é alterado.



QUESTÃO 29

A nutrição enteral por sonda é indicada na presença ou risco de desnutrição quando a via oral é insuficiente para evitar a perda de peso. Acerca deste tema, é correto afirmar:

- A) São contra-indicações absolutas o íleo paralítico, enterocolite necrosante e fistula entérica de alto débito;
- B) Em pacientes gravemente doentes, a infusão contínua é preferencial em relação à intermitente;
- C) A obstrução intestinal é contra-indicação relativa, pois em volumes pequenos podem favorecer a perfusão intestinal;
- D) Caso a perspectiva de uso da NE seja por período maior que um mês, deve ser considerado a gastrostomia.

QUESTÃO 30

A prevenção para as causas de complicações gastrointestinais da nutrição enteral são:

- A) Diminuir a diluição ou mudar a fórmula e usar fórmula sem lactose pode prevenir a diarreia;
- B) No caso da distensão abdominal pode ser considerado a diminuição do fluxo ou volume da infusão e a suspensão das drogas causadoras;
- C) Manter a hidratação e dieta rica em fibras, além de fórmula sem lactose pode prevenir a distensão abdominal;
- D) Quando ocorrem náuseas e vômitos o aumento do fluxo da infusão e a adição de fibras na fórmula podem prevenir novos episódios.