



PROCESSO SELETIVO
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
HOSPITAL REGIONAL NORTE - HRN
02 de junho de 2019



ENFERMEIRO NEONATOLOGISTA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 - a) Este caderno com **30 (trinta) questões** de prova, sem repetição ou falha;
 - b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
 - a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
 - b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
 - c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
 - d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
 - e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
 - f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver *item e*) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 *Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova*);
 - g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
 - h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
 - i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
 - j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
 - k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
 - l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

SOLIDARIEDADE...

Lya Luft

É muito mais do que doar agasalhos ou alimentos para instituições. Mas... O que é ser solidário? Onde deve começar este aprendizado? O texto a seguir aborda essas questões, é um chamamento para a ação (que pode estar bem ao seu alcance).

O gesto não precisa ser grandioso nem público, não é necessário pertencer a uma ONG ou fazer uma campanha. Sobretudo, convém não aparecer.

O gesto primeiro devia ser natural, e não decorrer de nenhum lema ou imposição, nem convite nem sugestão vinda de fora. Assim devíamos ser habitualmente, e não somos, ou geralmente não somos: cuidar do que está do nosso lado.

Cuidar não só na doença ou na pobreza mas no cotidiano, em que tantas vezes falta a delicadeza, a gentileza, a compreensão; esquecidos os pequenos rituais de respeito, de preservação do mistério, e igualmente da superação das barreiras estéreis entre pessoas da mesma casa, da família, das amizades mais próximas. Dentro de casa, onde tudo deveria começar, onde se deveria fazer todo dia o aprendizado do belo, do generoso, do delicado, do respeitoso, do agradável e do acolhedor, mal passamos, correndo, tangidos pelas obrigações.

Tão fácil atualmente desculpar-se com a pressa: o trânsito, o patrão, o banco, a conta, a hora extra... Tudo isso é real, tudo isso acontece e nos enreda e nos paralisa.

Mas, por outro lado, se a gente parasse (mas parar pra pensar pode ser tão ameaçador...) e fizesse um pequeno cálculo, talvez metade ou boa parte desses deveres aparecesse como supérfluo, frívolo, dispensável.

Uma hora a mais em casa não para se trancar no quarto, mas para conviver. Não com obrigação, sermos felizes com hora marcada e prazo pra terminar, mas promover desde sempre a casa como o lugar do encontro, não da passagem; a mesa como lugar do diálogo, não do engolir quieto e apressado; o quarto como o lugar do afeto, não do cansaço.

Pois se ainda não começamos a ser solidários dentro de nós mesmos e dentro de nossa casa ou do nosso círculo de amigos, como querer fazer campanhas, como pretender desfraldar bandeiras, como desejar salvar o mundo - se estamos perdidos no nosso cotidiano? Como dizer a palavra certa se estamos mudos, como escutar se estamos surdos, como abraçar se estamos congelados?

Para mim, a solidariedade precisa ser antes de tudo o aprendizado da humanidade pessoal. Depois de sermos gente, podemos - e devemos - sair dos muros e tentar melhorar o mundo. Que anda tão, tão precisado.

QUESTÃO 01

Considere as afirmações acerca do texto, julgando-as como V (para verdadeiras) e F (para falsas):

- () Segundo a autora, a solidariedade vai além de gestos de doações e campanhas, é um aprendizado da humanidade pessoal;
- () Pelas características o texto é uma notícia, em razão de seu caráter objetivo;
- () Predomina a descrição, por ser um texto injuntivo;
- () Predomina, como tipologia, a dissertação.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, F;
- C) V, F, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 02

Sobre aspectos linguísticos do texto, analise as informações:

- I. "**Mas**, por outro lado, se a gente parasse (mas parar, pra pensar pode ser tão ameaçador...)" o elemento coesivo destacado pode ser substituído por, "todavia" sem alterar o sentido da frase;
- II. "...em que tantas vezes falta a delicadeza, a gentileza, a compreensão", as vírgulas são usadas para separar termos de mesmo valor sintático;
- III. As palavras "fácil", "solidário" e "frívolo" são acentuadas pela mesma regra gramatical;
- IV. "**Sobretudo**, convém não aparecer." O elemento coesivo destacado pode ser substituído por "principalmente", mantendo a coerência textual.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) I, II e III;
- C) II e III;
- D) I, II e IV.



Leia o poema de Cecília Meireles para responder às questões 03 e 04:

Motivo

Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.

Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
no vento.

Se desmorono ou se edifico,
se permaneço ou me desfaço,
— não sei, não sei. Não sei se fico
ou passo.

Sei que canto. E a canção é tudo.
Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:
— mais nada."

MEIRELES, Cecília. Antologia Poética. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2001.

QUESTÃO 03

Assinale a opção correta em relação ao texto:

- A) O poema mostra, de forma bem pessimista, as incertezas em relação à vida e como não podemos abandonar o passado;
- B) Além da função poética, há o predomínio da função emotiva;
- C) "Fugidias" pode ser interpretado como perenes;
- D) Há no poema o predomínio da função metalinguística.

QUESTÃO 04

"E um dia sei que estarei mudo". A palavra destacada pertence à classe gramatical dos:

- A) Adjetivos;
- B) Substantivos;
- C) Verbos;
- D) Advérbios.

QUESTÃO 05

Assinale a opção em que a frase está de acordo com as regras da Gramática Normativa quanto à regência verbal:

- A) Esqueceu dos velhos amigos;
- B) O povo chamava-o maluco;
- C) Prefiro mais uma vida agitada na cidade do que uma vida tranquila no campo;
- D) Cheguei cedo na prova.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

A Constituição vigente no Brasil foi promulgada em 1988 e garantiu uma série de direitos à população brasileira. No que diz respeito à saúde analise as afirmativas e em seguida marque a opção correta:

- I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
- II. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: centralização, com direção única; atendimento integral, com prioridade para as atividades de recuperação; participação da comunidade;
- III. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada;
- IV. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) I, III e IV;
- C) I e III;
- D) I e IV.

QUESTÃO 07

A respeito da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinados a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal serão rateados. Em relação ao rateio do FNS, marque a opção correta:

- A) Pelo menos setenta e cinco por cento, aos Municípios, destinando-se o restante aos Estados;
- B) Pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios;
- C) Pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados;
- D) Cinquenta por cento aos Municípios e cinquenta por cento aos Estados.

QUESTÃO 08

A Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Em relação às competências previstas na referida Lei, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Constitui competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;
- () Compete à direção municipal do SUS formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
- () Ao Distrito Federal compete, somente, exercer as atribuições reservadas aos estados;
- () À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, F, F, V;
- B) F, V, F, F;
- C) V, F, F, F;
- D) F, V, F, V.



QUESTÃO 09

A Portaria Nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006, divulgou o Pacto pela Saúde indicando aspectos relevantes para a consolidação do SUS e aprovando as diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Nesse sentido, assinale a opção correta:

- A) O Piso da Atenção Básica Variável passa a ser composto somente pelo financiamento da Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde;
- B) O Limite Financeiro de Vigilância em Saúde será transferido em parcelas semestrais para cada um dos Estados, Municípios e Distrito Federal;
- C) O Ministério da Saúde repassará aos Estados, mensalmente, valores financeiros apurados em encontro de contas trimestrais, de acordo com as informações encaminhadas pelos Estados, com base nas emissões das Autorizações para Pagamento de Alto Custo (APAC);
- D) As prioridades do pacto em defesa do SUS são: saúde do idoso, câncer de colo de útero e de mama, mortalidade infantil e materna, doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; promoção da saúde e atenção básica à saúde.

QUESTÃO 10

Sobre o financiamento do SUS, assinale a opção correta:

- A) O repasse direto e automático de recursos para a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Estados, está condicionado à existência de Fundo de Saúde e à apresentação de Plano de Saúde;
- B) O Sistema Único de Saúde é financiado com recursos provenientes da União e Estado;
- C) Gastos com saneamento básico e aposentadoria de servidores da saúde podem ser incluídos pelos Municípios como despesas em saúde;
- D) Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através da Secretaria de Finanças Estratégicas.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

O recém-nascido (RN) que se apresenta aparentemente saudável na avaliação sumária realizada na sala de parto, deve ser submetido a exame físico minucioso após algumas horas de vida. O RN como um todo ou em seus segmentos corporais admite um exame que vai do externo para o interno e no sentido craniocaudal. Inspeção, palpação, percussão e ausculta devem ser aplicadas nos diversos segmentos examinados. Considerando os possíveis achados da inspeção da pele do RN, assinale a opção verdadeira:

- A) Manchas mongólicas são achados anormais, de cor azul-acinzentadas localizadas preferencialmente no dorso e nas regiões glútea e lombossacra, podendo ser disseminadas; traduzindo malignidade dos melanócitos;
- B) Lanugo consiste nos pelos finos que costumam recobrir a região do ombro e da escápula, mais abundante em RN prematuros, desaparecem em alguns dias;
- C) O milium sebáceo manifesta-se por pequenos pontos brancos localizados na base do nariz, queixo e fronte, devido à distensão e obstrução das glândulas sudoríparas, de caráter permanente;
- D) O vérnix caseoso é um achado anormal que compromete a proteção da pele e o isolamento térmico, tornando o RN mais vulnerável às adversidades do ambiente.

QUESTÃO 12

O sarampo é uma doença viral grave e altamente contagiosa. Crianças pequenas não vacinadas estão em maior risco de contrai-lo e de sofrer com suas complicações. A vacina é a única forma de prevenir a ocorrência do sarampo na população, estando disponível no Calendário Nacional de Vacinação. Considerando o Calendário Nacional de Vacinação e a imunização infantil contra o sarampo, analise cada afirmativa como verdadeira (V) ou (F) e assinale a opção correta.

- I. As vacinas para a profilaxia do sarampo são a tríplice viral e a tetra viral, compostas por vírus inativados;
- II. A primeira dose deve ser aos 9 meses de idade com a vacina tríplice viral e a segunda dose aos 15 meses de idade, com a vacina tetra viral;
- III. Em situação de bloqueio vacinal em crianças menores de 12 meses, deve-se administrar uma dose de tríplice viral entre 6 meses e 11 meses de idade, mantendo-se esquema vacinal;
- IV. Lactentes, cujas mães já tiveram sarampo ou foram vacinadas, possuem imunidade passiva transitória conferida por anticorpos transmitidos pela via transplacentária.

É (são) verdadeira(s):

- A) Apenas IV;
- B) Apenas I e IV;
- C) Apenas III e IV;
- D) Todos as afirmativas.

QUESTÃO 13

Constituem cuidados com o recém-nascido sadio após o parto, segundo as recomendações das Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, EXCETO:

- A) Estimular as mulheres a terem contato pele a pele imediato com a criança logo após o nascimento, retirando qualquer campo ou toalha que cubra o recém-nascido;
- B) Evitar a separação mãe-filho na primeira hora após o nascimento para procedimentos de rotina tais como, pesar, medir e dar banho;
- C) Estimular o início precoce do aleitamento materno, idealmente na primeira hora de vida;
- D) Registrar a circunferência cefálica, temperatura corporal e peso após a primeira hora de vida.



QUESTÃO 14

Um dos parâmetros utilizados para classificação do risco ao nascer é a idade gestacional do recém-nascido (RN). Muitas vezes, a data da última menstruação (DUM) ou a ultrassonografia gestacional precoce não é uma informação disponível, sendo necessária a utilização de outros métodos para sua estimativa, como o Método de Capurro, que se baseia na observação de cinco características físicas e duas neurológicas para estimar a idade gestacional do RN. Compreende uma característica física do neonato avaliada por este método:

- A) Textura da pele;
- B) Respiração;
- C) Irritabilidade reflexa;
- D) Frequência cardíaca.

QUESTÃO 15

A Enterocolite Neonatal é uma das mais graves, devastadoras e desafiadoras doenças que comprometem recém-nascidos internados em unidades de terapia intensiva neonatal. Compreendem cuidados a serem realizados em caso de suspeita de Enterocolite necrosante no neonato:

- A) Realizar sondagem orogástrica e manter a sonda em drenagem para aliviar a distensão abdominal;
- B) Instalar imediatamente ou manter a nutrição por via enteral;
- C) Utilizar sonda orogástrica de maior calibre possível para a criança, a fim de garantir o aporte contínuo de alimentação gástrica;
- D) 48 horas após a normalização do quadro clínico e laboratorial, o leite materno não deve ser a primeira escolha para reinício de alimentação enteral.

QUESTÃO 16

A icterícia constitui-se em um dos problemas mais frequentes no período neonatal e corresponde à expressão clínica da hiperbilirrubinemia. Considere esta condição clínica no recém-nascido e assinale a opção correta:

- A) A hiperbilirrubinemia fisiológica é incomum entre os recém-nascidos a termo, refletindo má adaptação neonatal ao metabolismo da bilirrubina durante a primeira semana de vida;
- B) Hiperbilirrubinemia significativa na primeira semana de vida pode estar associada à oferta láctea inadequada, perda elevada de peso e desidratação;
- C) A avaliação clínica é fundamental e suficiente para avaliar a gravidade da icterícia, pois esta apresenta progressão céfalo-caudal;
- D) A amostra de sangue coletada para dosagem de bilirrubina deve permanecer em frasco ou capilar condicionado em contato com a luz natural e em temperatura ambiente.

QUESTÃO 17

Constituem cuidados que devem ser seguidos durante o uso de fototerapia para o tratamento da icterícia neonatal:

- A) Evitar verificar a temperatura corporal do neonato para reduzir o manuseio e interrupção da terapia, avaliando apenas o peso diariamente;
- B) Reduzir a oferta hídrica, pois a fototerapia pode provocar aumento do consumo de oxigênio, da frequência respiratória e do fluxo sanguíneo na pele, propiciando hipervolemia;
- C) Manter os olhos expostos para promover maior rapidez na degradação da bilirrubina;
- D) Cobrir a solução parenteral e o equipo instalados com papel alumínio ou usar extensores impermeáveis à luz.

QUESTÃO 18

O advento da terapêutica de reposição de surfactante modificou de maneira expressiva o prognóstico dos recém-nascidos pré-termo com insuficiência respiratória. Acerca deste medicamento e dos cuidados em sua administração, assinale a opção incorreta:

- A) O medicamento deve ser mantido sob refrigeração até o seu uso;
- B) Para homogeneizar o produto, virar o frasco de cabeça para baixo por duas vezes, sem agitá-lo, para evitar formação de espuma e sua inativação;
- C) Não aspirar a cânula traqueal na primeira hora subsequente à instilação do surfactante, exceto se houver evidência clínica de obstrução da cânula;
- D) Ocorrência de bradicardia e/ou hipoxemia não são indicativos para interromper a administração da droga.

QUESTÃO 19

O distúrbio do metabolismo da glicose é uma das intercorrências mais frequentes em neonatologia. A ocorrência de hipoglicemia por período prolongado pode trazer graves consequências para o sistema nervoso central, que depende basicamente da glicose e do oxigênio para seu metabolismo energético. Considerando a hipoglicemia no neonato, seus fatores de risco e sua manifestação, assinale a opção correta.

- A) O diagnóstico, assim como o início do tratamento, deve ser precoce, já que o atraso na correção da hipoglicemia pode levar a dano neurológico grave;
- B) A macrosomia é um indicativo de possibilidade de hiperinsulinismo, que pode levar à hipoglicemia por excesso de insulina em relação à quantidade de glicose;
- C) É frequente no recém-nascido prematuro e no pequeno para a idade gestacional em decorrência da diminuição de reservas de glicose neste grupo;
- D) Suas manifestações clínicas são específicas, sendo facilmente identificadas pelos sinais de tremores, hipotonia, letargia e sucção débil, sempre presentes em sua ocorrência.



QUESTÃO 20

Recém-nascidos (RN) portadores de cardiopatias congênitas representam um grupo de alto risco pelas elevadas mortalidade e morbidade. Devido à gravidade de grande parte das cardiopatias no período neonatal, essa condição necessita ser diagnosticada e tratada imediatamente. Acerca das manifestações clínicas das cardiopatias congênitas nos RN e seus cuidados, assinale a opção correta:

- A) Não há necessidade de monitorar a saturação periférica de oxigênio pela oximetria de pulso, pois a cianose deve ser identificada pela inspeção da coloração da pele, principalmente nas extremidades e região perioral;
- B) A manutenção da frequência respiratória acima de 20 incursões respiratórias por minuto (IRPM) revela presença de taquipneia, sendo sinal de alerta para a possibilidade de cardiopatia congênita;
- C) Para a maioria dos RNs com cardiopatias congênitas e em oxigenoterapia, a saturação periférica ideal de oxigênio encontra-se entre 85 e 90%, a fim de se evitar piora clínica;
- D) A presença de sopros cardíacos significativos não é um sinal de alerta, pois eles não estão presentes na maioria das cardiopatias congênitas graves no período neonatal.

QUESTÃO 21

A hemorragia peri-intraventricular é uma condição de alta incidência em recém-nascido (RN) pré-termo e ocasiona, em muitos casos, o desenvolvimento de sequelas neurológicas graves, com elevado custo social. Considere esta condição clínica no RN e assinale a opção incorreta.

- A) Prematuridade, peso ao nascimento inferior a 1.500g, policitemia e sepse são considerados fatores de risco para a hemorragia peri-intraventricular relacionados ao RN;
- B) Difícilmente o RN é assintomático, pois o quadro clínico é bastante específico, revelado por estupor/coma profundos, hipoventilação, apneia, convulsão e pupilas areativas;
- C) O local mais comum para sangramento cerebral no RN pré-termo é a matriz germinativa, que é irrigada por um rico leito capilar, com proliferação que envolve à medida que o RN se aproxima da maturidade;
- D) A principal estratégia para evitar seu aparecimento é a prevenção da prematuridade.

QUESTÃO 22

Compreendem medidas para o controle de infecção em Unidade de Internação Neonatal, exceto:

- A) A entrada de profissionais e familiares na Unidade deve ser triada. Pessoas com infecções respiratórias, cutâneas ou diarreia não devem ter contato direto com o recém-nascido;
- B) Manter os recém-nascidos alimentados por sonda gástrica em decúbito lateral direito, sem elevar a cabeça, evitando assim a aspiração de conteúdo gástrico;
- C) Deve-se suspender imediatamente o uso do antimicrobiano quando o diagnóstico de infecção for afastado ou quando do término do tratamento;
- D) Deve-se proteger os olhos do recém-nascido durante a aspiração do tubo traqueal, evitando assim a contaminação por secreção pulmonar.

QUESTÃO 23

O Método Canguru é um modelo de assistência perinatal voltado para a melhoria da qualidade do cuidado do recém-nascido de baixo peso, sendo incorporado às políticas de saúde no campo perinatal visando a redução da morbimortalidade neonatal. Acerca desse método, assinale as afirmativas a seguir com V (para verdadeira) ou F (para falsa) e assinale a opção correta.

- () O contato pele a pele começa com o toque evoluindo até a posição canguru, que consiste em manter o recém-nascido em contato pele a pele com a mãe, exclusivamente, na posição vertical, junto ao peito materno;
- () A primeira etapa do método se inicia na sala de parto seguida da internação do recém-nascido na Unidade Neonatal;
- () Na segunda etapa, o bebê permanece de maneira contínua com sua mãe e a posição canguru será realizada pelo maior tempo possível;
- () A terceira etapa se caracteriza pelo acompanhamento da criança e da família no ambulatório e/ou no domicílio até atingir o peso de 2.500g.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, V, F, V;
- B) F, F, V, F;
- C) V, V, V, V;
- D) F, F, V, V.



QUESTÃO 24

O aleitamento materno constitui a melhor estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança, sendo a intervenção mais eficaz para redução da morbimortalidade infantil. O retorno materno ao trabalho pode ser um importante obstáculo à amamentação. Nessa situação, para sua manutenção, é importante que o profissional da saúde oriente a mãe trabalhadora quanto a algumas medidas, como a ordenha do leite materno. Constituem orientações adequadas sobre a ordenha, armazenamento e oferta do leite materno ordenhado:

- A) Leite cru (não pasteurizado) pode ser conservado em geladeira por 48 horas e, no freezer ou congelador, por 15 dias;
- B) Para alimentar o bebê com leite ordenhado congelado, esse deve ser descongelado no fogo. Uma vez descongelado, o leite deve ser aquecido em banho-maria no fogo;
- C) Dispor de vasilhame de vidro esterilizado para receber o leite, preferencialmente vidros de boca larga com tampas plásticas que possam ser submetidos à fervura durante mais ou menos 20 minutos;
- D) Realizar a ordenha, de preferência manual, curvar o tórax sobre o abdômen, para facilitar a saída do leite e aumentar o fluxo, colocar o polegar e o indicador no bico do mamilo com os dedos da mão em forma de "C".

QUESTÃO 25

Intervenções não farmacológicas têm sido recomendadas para o alívio e manejo da dor durante procedimentos relacionados à dor aguda em recém-nascidos (RN). Possuem eficácia comprovada e apresentam baixo risco para os bebês, assim como baixo custo operacional no que se refere aos cuidados intensivos. A opção que apresenta informações falsas acerca de intervenções não farmacológicas para manejo da dor em RN é:

- A) O contato pele a pele, apesar de ter diversos benefícios, mostra-se ineficaz para diminuir a dor do RN durante procedimentos agudos;
- B) A sucção não nutritiva inibe a hiperatividade, modula o desconforto do RN e diminui a dor quando submetidos a procedimentos dolorosos agudos;
- C) A ingestão de leite humano, preferencialmente o materno, retirado diretamente do seio ou oferecido por sonda nasogástrica, pode ser uma potente intervenção para alívio de dor;
- D) Recomenda-se o emprego clínico de água com sacarose ou glicose, por via oral (administrada na porção anterior da língua) 2 minutos antes de pequenos procedimentos.

QUESTÃO 26

A temperatura corporal é o resultado do balanço entre os mecanismos de produção e de eliminação do calor. No recém-nascido (RN), sobretudo no pré-termo, pode ocorrer desequilíbrio desses mecanismos, com aumento nas perdas e limitação na produção. Associe os mecanismos de perda de calor, listados na Coluna I, com suas características na Coluna II, em seguida assinale a opção correta.

Coluna I

- 1. Evaporação;
- 2. Radiação;
- 3. Convecção;
- 4. Condução.

Coluna II

- A. Perda de calor do RN para objetos ou superfícies mais frias que não estão em contato com ele;
- B. Perda de calor do RN para a superfície fria em contato com ele;
- C. Perda insensível de água pela pele; principal forma de perda de calor em RN prematuro;
- D. Forma pela qual ocorre perda de calor da pele do RN para o ar ao seu redor.

A associação correta está em:

- A) 1-B, 2-C, 3-A, 4-D;
- B) 1-C, 2-A, 3-D, 4-B;
- C) 1-D, 2-B, 3-C, 4-A;
- D) 1-A, 2-D, 3-B, 4-C.

QUESTÃO 27

Considerando a Síndrome de Aspiração Meconial (SAM), de elevada mortalidade entre os recém-nascidos acometidos, assinale a opção falsa.

- A) Ocorrência de asfixia perinatal e idade gestacional maior que 40 semanas compreendem risco para a SAM;
- B) Acredita-se que a aspiração possa ocorrer intraútero quando o bem-estar fetal é interrompido com a instalação da hipoxemia;
- C) Os sintomas respiratórios são de início tardio e progressivo, raramente com a presença de cianose grave;
- D) A aspiração pode ocorrer após o nascimento, com as primeiras respirações.



QUESTÃO 28

O transporte inter-hospitalar do recém-nascido (RN) ocorre principalmente quando há necessidade de recursos de cuidados intensivos não disponíveis nos hospitais de origem. O transporte pode se tornar um risco a mais para o RN criticamente doente e, por isso, deve ser considerado como uma extensão dos cuidados realizados na UTI. Assinale a opção com informações falsas acerca de procedimentos preparatórios na Unidade de origem para o transporte neonatal inter-hospitalar.

- A) O consentimento para remoção deve ser mediante autorização escrita, concedida e assinada pelo diretor do hospital, o responsável pelo RN. Apenas em casos de risco iminente de vida, a mãe é a responsável pela liberação do transporte;
- B) Para a transferência do RN, é necessária a solicitação de vaga em outro hospital, mediante comunicação do profissional solicitante com uma central reguladora de vagas ou, eventualmente, diretamente com o hospital de destino;
- C) É necessária a avaliação do índice de risco para o transporte no início e ao final do procedimento;
- D) Manutenção da temperatura corporal do RN e avaliação da dor são aspectos do monitoramento para estabilização clínica do RN antes do transporte.

QUESTÃO 29

A reanimação, definida de forma ampla como o apoio especializado para uma transição bem-sucedida ao nascer, tem sido um foco dentre os esforços para diminuir a mortalidade neonatal precoce. Considerando as medidas iniciais da estabilização/reanimação de recém-nascido (RN) ≥ 34 semanas em sala de parto analise as afirmativas a seguir e assinale a opção correta.

- I. Recomenda-se que a temperatura axilar do RN seja mantida entre 35,0-37,5°C (normotermia), desde o nascimento até a admissão no alojamento conjunto ou na Unidade neonatal.
- II. O RN é levado à mesa de reanimação envolto em campos aquecidos e posicionado sob calor radiante, em decúbito dorsal, com a cabeça voltada para o profissional de saúde, com o pescoço em hiperextensão.
- III. A aspiração deve ser realizada em todos os RN após seu posicionamento no berço aquecido.
- IV. A avaliação da respiração é feita por meio da observação da expansão torácica ou da presença de choro. A respiração espontânea está adequada se os movimentos são regulares e suficientes para manter a frequência cardíaca acima de 60 bpm.

São verdadeiras:

- A) Apenas, II e III;
- B) Apenas I e IV;
- C) Apenas II e IV;
- D) Nenhuma afirmativa.

QUESTÃO 30

Considerando o procedimento de exsanguineotransfusão, assinale a opção correta.

- A) Deve ser feita por intermédio de um vaso calibroso central, preferencialmente a arterial umbilical;
- B) As operações de retirada e injeção de sangue na criança são sempre realizadas de forma suave e rápida, com atenção à frequência cardíaca e à oximetria;
- C) Insuficiência cardíaca congestiva pode ser uma complicação decorrente de excesso de volume e velocidade incorreta nas trocas;
- D) O sangue a ser infundido deve ser mantido frio, em temperaturas entre 2° e 8°C.