



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

SOLIDARIEDADE...

Lya Luft

É muito mais do que doar agasalhos ou alimentos para instituições. Mas... O que é ser solidário? Onde deve começar este aprendizado? O texto a seguir aborda essas questões, é um chamamento para a ação (que pode estar bem ao seu alcance).

O gesto não precisa ser grandioso nem público, não é necessário pertencer a uma ONG ou fazer uma campanha. Sobretudo, convém não aparecer.

O gesto primeiro devia ser natural, e não decorrer de nenhum lema ou imposição, nem convite nem sugestão vinda de fora. Assim devíamos ser habitualmente, e não somos, ou geralmente não somos: cuidar do que está do nosso lado.

Cuidar não só na doença ou na pobreza mas no cotidiano, em que tantas vezes falta a delicadeza, a gentileza, a compreensão; esquecidos os pequenos rituais de respeito, de preservação do mistério, e igualmente da superação das barreiras estéreis entre pessoas da mesma casa, da família, das amizades mais próximas. Dentro de casa, onde tudo deveria começar, onde se deveria fazer todo dia o aprendizado do belo, do generoso, do delicado, do respeitoso, do agradável e do acolhedor, mal passamos, correndo, tangidos pelas obrigações.

Tão fácil atualmente desculpar-se com a pressa: o trânsito, o patrão, o banco, a conta, a hora extra... Tudo isso é real, tudo isso acontece e nos enreda e nos paralisa.

Mas, por outro lado, se a gente parasse (mas parar pra pensar pode ser tão ameaçador...) e fizesse um pequeno cálculo, talvez metade ou boa parte desses deveres aparecesse como supérfluo, frívolo, dispensável.

Uma hora a mais em casa não para se trancar no quarto, mas para conviver. Não com obrigação, sermos felizes com hora marcada e prazo pra terminar, mas promover desde sempre a casa como o lugar do encontro, não da passagem; a mesa como lugar do diálogo, não do engolir quieto e apressado; o quarto como o lugar do afeto, não do cansaço.

Pois se ainda não começamos a ser solidários dentro de nós mesmos e dentro de nossa casa ou do nosso círculo de amigos, como querer fazer campanhas, como pretender desfraldar bandeiras, como desejar salvar o mundo - se estamos perdidos no nosso cotidiano? Como dizer a palavra certa se estamos mudos, como escutar se estamos surdos, como abraçar se estamos congelados?

Para mim, a solidariedade precisa ser antes de tudo o aprendizado da humanidade pessoal. Depois de sermos gente, podemos - e devemos - sair dos muros e tentar melhorar o mundo. Que anda tão, tão precisado.

QUESTÃO 01

Considere as afirmações acerca do texto, julgando-as como V (para verdadeiras) e F (para falsas):

- () Segundo a autora, a solidariedade vai além de gestos de doações e campanhas, é um aprendizado da humanidade pessoal;
- () Pelas características o texto é uma notícia, em razão de seu caráter objetivo;
- () Predomina a descrição, por ser um texto injuntivo;
- () Predomina, como tipologia, a dissertação.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, V, F;
- C) V, F, F, V;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 02

Sobre aspectos linguísticos do texto, analise as informações:

- I. "**Mas**, por outro lado, se a gente parasse (mas parar, pra pensar pode ser tão ameaçador...)" o elemento coesivo destacado pode ser substituído por, "todavia" sem alterar o sentido da frase;
- II. "...em que tantas vezes falta a delicadeza, a gentileza, a compreensão", as vírgulas são usadas para separar termos de mesmo valor sintático;
- III. As palavras "fácil", "solidário" e "frívolo" são acentuadas pela mesma regra gramatical;
- IV. "**Sobretudo**, convém não aparecer." O elemento coesivo destacado pode ser substituído por "principalmente", mantendo a coerência textual.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) I, II e III;
- C) II e III;
- D) I, II e IV.



Leia o poema de Cecília Meireles para responder às questões 03 e 04:

Motivo

Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.

Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
no vento.

Se desmorono ou se edifico,
se permaneço ou me desfaço,
— não sei, não sei. Não sei se fico
ou passo.

Sei que canto. E a canção é tudo.
Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:
— mais nada."

MEIRELES, Cecília. Antologia Poética. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2001.

QUESTÃO 03

Assinale a opção correta em relação ao texto:

- A) O poema mostra, de forma bem pessimista, as incertezas em relação à vida e como não podemos abandonar o passado;
- B) Além da função poética, há o predomínio da função emotiva;
- C) "Fugidias" pode ser interpretado como perenes;
- D) Há no poema o predomínio da função metalinguística.

QUESTÃO 04

"E um dia sei que estarei mudo". A palavra destacada pertence à classe gramatical dos:

- A) Adjetivos;
- B) Substantivos;
- C) Verbos;
- D) Advérbios.

QUESTÃO 05

Assinale a opção em que a frase está de acordo com as regras da Gramática Normativa quanto à regência verbal:

- A) Esqueceu dos velhos amigos;
- B) O povo chamava-o maluco;
- C) Prefiro mais uma vida agitada na cidade do que uma vida tranquila no campo;
- D) Cheguei cedo na prova.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

A Constituição vigente no Brasil foi promulgada em 1988 e garantiu uma série de direitos à população brasileira. No que diz respeito à saúde analise as afirmativas e em seguida marque a opção correta:

- I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
- II. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: centralização, com direção única; atendimento integral, com prioridade para as atividades de recuperação; participação da comunidade;
- III. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada;
- IV. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) I, III e IV;
- C) I e III;
- D) I e IV.

QUESTÃO 07

A respeito da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinados a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal serão rateados. Em relação ao rateio do FNS, marque a opção correta:

- A) Pelo menos setenta e cinco por cento, aos Municípios, destinando-se o restante aos Estados;
- B) Pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios;
- C) Pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados;
- D) Cinquenta por cento aos Municípios e cinquenta por cento aos Estados.

QUESTÃO 08

A Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Em relação às competências previstas na referida Lei, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Constitui competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;
- () Compete à direção municipal do SUS formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
- () Ao Distrito Federal compete, somente, exercer as atribuições reservadas aos estados;
- () À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, F, F, V;
- B) F, V, F, F;
- C) V, F, F, F;
- D) F, V, F, V.



QUESTÃO 09

A Portaria Nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006, divulgou o Pacto pela Saúde indicando aspectos relevantes para a consolidação do SUS e aprovando as diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Nesse sentido, assinale a opção correta:

- A) O Piso da Atenção Básica Variável passa a ser composto somente pelo financiamento da Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde;
- B) O Limite Financeiro de Vigilância em Saúde será transferido em parcelas semestrais para cada um dos Estados, Municípios e Distrito Federal;
- C) O Ministério da Saúde repassará aos Estados, mensalmente, valores financeiros apurados em encontro de contas trimestrais, de acordo com as informações encaminhadas pelos Estados, com base nas emissões das Autorizações para Pagamento de Alto Custo (APAC);
- D) As prioridades do pacto em defesa do SUS são: saúde do idoso, câncer de colo de útero e de mama, mortalidade infantil e materna, doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; promoção da saúde e atenção básica à saúde.

QUESTÃO 10

Sobre o financiamento do SUS, assinale a opção correta:

- A) O repasse direto e automático de recursos para a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Estados, está condicionado à existência de Fundo de Saúde e à apresentação de Plano de Saúde;
- B) O Sistema Único de Saúde é financiado com recursos provenientes da União e Estado;
- C) Gastos com saneamento básico e aposentadoria de servidores da saúde podem ser incluídos pelos Municípios como despesas em saúde;
- D) Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através da Secretaria de Finanças Estratégicas.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

Com relação às cardiopatias e medicações de tratamento na gestação, assinale a opção correta:

- A) O Captopril é a droga de escolha para ser usada em uma crise hipertensiva;
- B) A Adenosina é uma droga segura para ser utilizada na gestação;
- C) A Gestante com instabilidade hemodinâmica devido a arritmia não deve ser cardiovertida ou desfibrilada;
- D) Na miocardiopatia periparto os sintomas devem se iniciar antes do terceiro mês de gestação.

QUESTÃO 12

Para uma gestante internada em um hospital particular o médico prescreveu 1500ml de soro fisiológico a 0,9% e 500ml de soro glicosado à 5% para ser infundidos em 20 horas. O gotejamento em gotas/minuto será de _____. Marque a opção que preenche corretamente a lacuna:

- A) 21gts/min;
- B) 31gts/min;
- C) 33gts/min;
- D) 37gts/min.

QUESTÃO 13

A escolha correta para a cobertura ideal no tratamento de feridas é de suma importância para a manutenção do meio úmido, é essencial para facilitar o desbridamento autolítico quando necessário, migração células epiteliais, liberação de fatores de crescimento, diminuição da dor, além de trocas sem traumas. Sobre os diversos tipos de curativos, assinale verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo:

- () Hidrocolóide: cobertura estéril, de poliuretano, semipermeável, sendo impermeável à líquidos e bactérias. Facilmente adaptável a áreas de contorno do corpo. Adesivo acrílico hipoalergênico, permitindo aderência somente à pele íntegra e não aderindo à superfície úmida, evitando o trauma durante a sua retirada;
- () Filme transparente: curativo composto por partículas com capacidade de absorção (gelatina, pectina e carboximetilcelulose) dispersas em água formando um gel semi-sólido;
- () Carvão ativado: cobertura composta por um polissacarídeo derivado de algas marinhas, utilizado como curativo em lesões abertas e altamente exsudativas, com alto poder de absorção;
- () Ácido graxo essencial é uma cobertura originada de óleos vegetais poli-insaturados compostos fundamentalmente de ácidos graxos essenciais: ácido linoleico, caprílico, cáprico, vitamina A, E e lecitina de soja;
- () O Hidrogel atua no sentido de umedecer o tecido desvitalizado e auxiliar no desbridamento autolítico; a umidade promove angiogênese. Indicado para feridas com necrose ou esfacelo.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) F, F, F, V, V;
- B) V, F, F, F, V;
- C) F, F, V, V, F;
- D) V, V, F, V, F.

QUESTÃO 14

Seja qual for a patologia que indique a internação do paciente, seu estado nutricional deverá ser mantido e, se deficiente, recuperado. Esta é a regra básica em termos de terapia nutricional adulto e pediátrico. Sobre a Nutrição Enteral e Nutrição Parenteral, marque a opção correta:

- A) É sempre preferível a nutrição enteral (NE) à nutrição parenteral (NP), mesmo quando o tubo digestivo possa ser utilizado;
- B) A via parenteral é sempre mais fisiológica e segura;
- C) A nutrição parenteral promove nutrição mais harmônica e em geral mais completa e evita, também, desequilíbrio hidroeletrólítico e infecções;
- D) Síndrome do intestino curto e diarreia grave crônica ou persistente são indicações de nutrição parenteral.



QUESTÃO 15

De acordo com as boas práticas para o processamento de produtos para saúde e para o funcionamento dos serviços que realizam o processamento de produtos para a saúde visando à segurança do paciente e dos profissionais envolvidos, assinale a opção correta:

- A) Produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia, só poderão ser submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes a base de aldeídos;
- B) Produtos para saúde classificados como semicríticos, utilizados na assistência ventilatória, anestesia e inaloterapia devem ser submetidos à limpeza e, no mínimo, à desinfecção de nível intermediário, com produtos saneantes em conformidade com a normatização sanitária, ou por processo físico de termodesinfecção, antes da utilização em outro paciente;
- C) Produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos ao processo de esterilização, após a limpeza e demais etapas do processo;
- D) Produtos para saúde classificados como críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de alto nível, após a limpeza.

QUESTÃO 16

“A credeização, aplicação de nitrato de prata a 1% no olho do recém-nascido, ou Método de Credé, atua na prevenção de _____ causada por um micro-organismo que pode ser transmitido da mãe para o bebê no canal do parto, caso ela esteja infectada.”

Assinale a opção que completa a lacuna corretamente:

- A) Calázio;
- B) Miliúm sebáceo;
- C) Úlcera de córnea;
- D) Oftalmia gonocócica.

QUESTÃO 17

Existem materiais biológicos sabidamente infectantes e envolvidos na transmissão do HIV. Assim, a exposição a esses materiais constitui situação na qual a Profilaxia Pós-Exposição - PEP está ou não recomendada. De acordo com o tema, marque a opção correta:

- A) A PEP está indicada; esta deve ser iniciada o mais precocemente possível, tendo como limite às 48 horas subsequentes à exposição;
- B) A exposição a vômito oferece risco de transmissão do HIV;
- C) A exposição ao líquido oferece risco de transmissão do HIV;
- D) A exposição ao líquido articular não oferece risco de transmissão do HIV.

QUESTÃO 18

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. São transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. Acerca deste tema, assinale a opção correta:

- A) O cancro mole é causado pela bactéria *Klebsiella granulomatis*, sendo mais frequente nas regiões tropicais;
- B) A Doença Inflamatória Pélvica (DIP) é caracterizada por feridas múltiplas e dolorosas de tamanho pequeno com presença de pus, que aparecem com frequência nos órgãos genitais (ex.: pênis, ânus e vulva);
- C) A donovanose é uma IST crônica progressiva, causada pela bactéria *Haemophilus ducreyi*;
- D) O linfogranuloma venéreo (LGV) é uma infecção crônica causada pela bactéria *Chlamydia trachomatis*, que atinge os órgãos genitais e os gânglios da virilha.

QUESTÃO 19

A rubéola é uma doença exantemática aguda, de etiologia viral, que apresenta alta contagiosidade e acomete principalmente crianças. Sua importância epidemiológica está relacionada ao risco de abortos, natimortos e malformações congênitas, como cardiopatias, catarata e surdez.

- A) A transmissão ocorre por meio de contato com secreções nasofaríngeas de pessoas infectadas. O vírus é disseminado por gotículas ou pelo contato direto com pessoas infectadas;
- B) O período de transmissibilidade é de aproximadamente de 10 a 15 dias antes do início do exantema e até 12 dias após o exantema;
- C) A doença se caracteriza-se por febre alta, acima de 38,5°C, exantema maculopapular generalizado, tosse, coriza, conjuntivite e manchas de Koplik;
- D) O vírus da rubéola pode ser identificado nas secreções nasofaríngeas e sangue.

**QUESTÃO 20**

O Brasil é um dos países que oferece o maior número de vacinas à população. Atualmente, o PNI disponibiliza mais de 300 milhões de doses anuais distribuídas entre 44 imunobiológicos, incluindo vacinas, soros e imunoglobulinas. Sobre o calendário de vacinação das gestantes, marque a opção correta:

- A) A vacina meningocócica C está indicada no 2º, 4º e 6º mês de gestação;
- B) A vacina da varicela não deve ser administrada em gestantes;
- C) Deve ser administrada apenas uma dose da vacina SRC (Tríplice Viral) após o terceiro mês de gestação;
- D) A vacina Dupla adulto (dT) e/ou Tríplice bacteriana (dTpa) tipo adulto deve ser dada sempre no início da gestação.

QUESTÃO 21

A Síndrome Hipertensiva Gestacional é uma importante complicação da gestação, estando entre as principais causas de morbimortalidade materna e fetal em especial em países em desenvolvimento. Acerca deste tema, marque a opção correta.

- A) A pré-eclâmpsia caracteriza-se pela presença de convulsões tônicoclônicas generalizadas ou coma em mulher com qualquer quadro hipertensivo, não causadas por epilepsia ou qualquer outra doença convulsiva. Pode ocorrer na gravidez, no parto e no puerpério imediato;
- B) Hipertensão crônica: hipertensão que ocorre após 20 semanas de gestação (ou antes, em casos de doença trofoblástica gestacional ou hidropsia fetal) acompanhada de proteinúria, com desaparecimento até 12 semanas pós-parto;
- C) Pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica: é o surgimento de pré-eclâmpsia em mulheres com hipertensão crônica ou doença renal. Nessas gestantes, essa condição agrava-se e a proteinúria surge ou piora após a 20ª semana de gravidez. Pode surgir trombocitopenia e ocorrer aumento nas enzimas hepáticas.
- D) Hipertensão gestacional (sem proteinúria): observada antes da gravidez, ou antes de 20 semanas de gestação, ou diagnosticada pela primeira vez durante a gravidez e não se resolve até 12 semanas após o parto.

QUESTÃO 22

De acordo com a assistência de enfermagem à gestante no primeiro período do parto, marque a opção correta:

- A) A duração do trabalho de parto ativo pode variar, nas primíparas dura em média 12 horas e é pouco provável que dure mais que 24 horas;
- B) A duração do trabalho de parto ativo pode variar, nas multiparas dura em média 8 horas e é pouco provável que dure mais que 15 horas;
- C) Para estar em trabalho de parto estabelecido é necessário ≥ 2 cm de dilatação cervical;
- D) A amniotomia precoce, associada ou não à ocitocina, não deve ser realizada de rotina em mulheres em trabalho de parto que estejam progredindo bem.

QUESTÃO 23

O atendimento ao recém-nascido consiste na assistência por profissional capacitado, médico (preferencialmente pediatra ou neonatologista) ou profissional de enfermagem (preferencialmente enfermeiro obstétrico/obstetrix ou neonatal), desde o período imediatamente anterior ao parto, até que o RN seja encaminhado ao Alojamento Conjunto com sua mãe, ou à Unidade Neonatal, ou ainda, no caso de nascimento em quarto de pré-parto, parto e puerpério (PPP) seja mantido junto à sua mãe, sob supervisão da própria equipe profissional responsável pelo PPP. Sobre os cuidados imediatos com o recém-nascido, marque a opção verdadeira:

- A) Realizar o índice de Apgar ao primeiro e décimo minutos de vida, rotineiramente.;
- B) Não se recomenda a aspiração orofaríngea e nem nasofaríngea sistemática do recém-nascido saudável;
- C) Recomenda-se realizar a passagem sistemática de sonda nasogástrica e retal para descartar atresias no recém-nascido saudável;
- D) O tempo de administração da profilaxia da oftalmia neonatal pode ser ampliado em até 8 horas após o nascimento.



QUESTÃO 24

É importante reconhecer que o período imediatamente após o nascimento é um momento delicado, quando a mulher e seus familiares vão finalmente conhecer a criança. Vale ressaltar a importância de que a assistência e qualquer intervenção que for realizada levem em consideração esse momento, no sentido de minimizar a separação entre mãe e filho. Sobre a assistência no terceiro período do parto, assinale a opção correta:

- A) O terceiro período do parto é o momento desde o nascimento da criança até a saída da mulher do centro obstétrico;
- B) Considerar terceiro período prolongado somente após decorridos 1 hora e 30 minutos;
- C) Deve-se realizar remoção placentária manual ou cirúrgica sem analgesia;
- D) Em caso de retenção placentária providenciar um acesso venoso calibroso.

QUESTÃO 25

O alojamento conjunto tem sido valorizado e recomendado no mundo inteiro, pelas inúmeras vantagens que oferece para a mãe, para a criança, para a família e para a própria instituição. Sobre as vantagens e desvantagens do alojamento conjunto assinale verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo:

- () Promoção do aleitamento materno. Vários estudos demonstram o efeito benéfico do alojamento conjunto na prática da amamentação: descida do leite mais rápida, melhor atitude em relação ao aleitamento materno e tempo mais prolongado de amamentação;
- () Recomenda-se, sempre que possível e desejável, que o binômio mãe-filho permaneça no alojamento conjunto por, no máximo, 48 horas;
- () Aumento do risco de infecção hospitalar. Há vários relatos de aumento das taxas de infecção neonatal após a implantação do alojamento conjunto em maternidades.
- () Gera influência negativa para as mães, em especial as primigestas, pois acabam aprendendo técnicas erradas com outras mães;
- () Maior envolvimento dos pais e/ou de outras pessoas significativas no futuro cuidado com a criança.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, F, F, F, V;
- B) V, F, V, F, V;
- C) F, V, F, V, F;
- D) F, F, F, F, F.

QUESTÃO 26

Nos últimos anos vêm crescendo o aumento da sobrevivência dos recém-nascidos (RNs). Juntamente com isso, outros problemas começaram a surgir, entre eles o aumento das taxas de infecção hospitalar (IH), principalmente, as bacterianas, que passaram a ser um dos fatores limitantes na sobrevivência desses RNs. De acordo com as IHS em RNs, marque a opção correta:

- A) Quanto maior for o peso ao nascer, maior é o risco de IH;
- B) As infecções precoces geralmente são decorrentes da contaminação do RN por bactérias do canal de parto, ou secundárias a bacteremias maternas;
- C) Antes de nascer existe o risco de IH por contato direto, contato indireto, fluidos contaminados e vias respiratórias;
- D) Mesmo após o nascimento o RN pode ser colonizado ou infectado intraútero por intermédio da placenta ou por via ascendente.

QUESTÃO 27

Amamentar é muito mais do que alimentar. Além de nutrir, a amamentação promove o vínculo afetivo entre mãe e filho e tem repercussões na habilidade da criança de se defender de infecções, em sua fisiologia e em seu desenvolvimento cognitivo e emocional, e também na saúde física e psíquica da mãe. Sobre o aleitamento materno assinale a opção correta:

- A) A exposição a pequenas doses de leite de vaca nos primeiros dias de vida parece diminuir o risco de alergia ao leite de vaca;
- B) A produção de leite logo após o nascimento da criança é controlada principalmente por hormônios e a apojadura ("descida do leite"), que costuma ocorrer após o quinto dia pós-parto, ocorre mesmo se a criança não sugar o seio;
- C) Alguns dos fatores de proteção do leite materno são totalmente ou parcialmente destruídos pelo calor, porém, o leite humano pasteurizado tem o mesmo valor biológico que o leite cru;
- D) Grande parte do leite de uma mamada é produzida enquanto a criança mama, sob o estímulo da prolactina.



QUESTÃO 28

Algumas intercorrências podem surgir durante o aleitamento materno (AM). Se não forem prontamente identificados e tratados, podem ser importantes fontes de ansiedade e sofrimento, podendo levar a uma interrupção definitiva da amamentação. Sobre as dificuldades do aleitamento materno, assinale a opção correta:

- A) É bastante raro RNs, aparentemente normais, não sugarem ou apresentarem sucção débil, ineficaz, logo após o nascimento;
- B) Medicamentos anestésicos administrados à mãe durante o trabalho de parto não interferem no início da amamentação;
- C) No trauma mamilar, pode ser indicado o uso de analgésicos sistêmicos por via oral;
- D) O tratamento "seco" das fissuras (banho de luz, banho de sol, secador de cabelo) tem sido bem recomendado pois, apesar de desidratar as camadas internas da epiderme (expostas pela lesão), ajuda na cicatrização.

QUESTÃO 29

As hemorragias na segunda metade da gestação são uma das principais causas de internação de gestantes no período anteparto, contribuindo com o aumento da morbimortalidade materna e perinatal. Entre as causas obstétricas, as mais importantes são o descolamento prematuro de placenta e a placenta prévia, que correspondem a até 50% dos diagnósticos. Também não podem ser esquecidas a rotura uterina e a rotura da vasa prévia. Sobre essas hemorragias da gestação assinale a opção correta:

- A) A placenta prévia é definida como a separação da placenta da parede uterina antes do parto. Essa separação pode ser parcial ou total e é classificada em três graus;
- B) A vasa prévia é definida como sangramento dos vasos sanguíneos fetais que atravessam as membranas amnióticas passando pelo orifício interno do colo. Está associada à inserção anormal dos vasos fetais dentro das membranas;
- C) O descolamento prematuro de placenta é definido como a placenta que se implanta total ou parcialmente no segmento inferior do útero, podendo ser classificada de três formas diferentes;
- D) A rotura uterina não é uma complicação considerada grave, podendo ser completa ou incompleta.

QUESTÃO 30

As cardiopatias congênitas ocorrem em nove de cada 1.000 nascidos vivos. Os recém-nascidos portadores de cardiopatias congênitas representam um grupo de alto risco pelas elevadas mortalidade e morbidade. Devido à gravidade de grande parte das cardiopatias no período neonatal, essa condição necessita ser diagnosticada e tratada imediatamente, evitando-se a deterioração hemodinâmica do bebê e lesões de outros órgãos, principalmente do sistema nervoso central. Sobre as cardiopatias congênitas assinale a alternativa correta:

- A) As cardiopatias só são manifestadas após o nascimento da criança;
- B) As cardiopatias congênitas no RN apresentam-se sempre com o conjunto dos seguintes fatores: cianose, baixo débito sistêmico e taquipneia e sopro cardíaco;
- C) As cardiopatias congênitas que se apresentam com cianose geralmente são aquelas em que o fluxo pulmonar é dependente do canal arterial;
- D) No período neonatal, a maioria das cardiopatias congênitas graves, já apresenta sopros cardíacos significativos.